

M 情報 5月 **今年もハエの季節が来ました。今が防除のチャンスです！**

ポイントを図にしてみました。ハエ対策はサルモネラ対策でもあります。薬品や、防除ネット等は出入りの業者・THMS 獣医師にお問い合わせ下さい。

[阿部]

牛舎内の発生ポイント模式図

ハエは「湿った有機物」に発生します。発生源をなくすることが防除の第一歩！

主な発生するハエ
イエバエ
(主に糞尿・汚物に発生)

サンバエ
(主に湿った敷料・糞尿に発生)

① 餌槽・残飼



食べ残しやこぼれた飼料は、イエバエが集まりやすいポイントです。

② 給水まわり・水たまり



こぼれた水や水たまりは湿度を高め、ハエの発生を助けます。

③ 通路・牛床の糞尿



糞尿の付着した部分はイエバエ・サンバエの発生源になります。

④ 寝床の湿った敷料



湿った敷料や尿で汚れた部分にサンバエがよく発生します。

⑤ 敷料の山・古い敷料置き場




古い敷料や発酵した敷料はハエの大発生源になります。

⑥ 牛舎周辺の糞尿・堆肥




牛舎外の糞尿・堆肥もハエの発生源になります。

⑦ 排水溝・側溝



汚れやヘドロがたまるとハエの幼虫が発生します。

⑩ 牛舎周りの草むら・藪 (サンバエの休息場所)



定期的な草刈りは、サンバエ密度低減に役立ちます。

⑧ 搾乳パーラー・ミルク残渣



ミルクのこぼれや残渣はイエバエを強く引き寄せます。

⑨ 出入口・カーテン周辺



外からのハエの侵入経路になります。隙間や開口に注意！

防除のポイント

- ◎ 発生源 (湿った有機物) をなくすることが最も重要です。
- ◎ 清掃・乾燥・換気を徹底しましょう。
- ◎ 幼虫 (ウジ) の段階での対策が効果的です。
- ◎ 成虫対策 (捕虫器・粘着シート・薬剤散布) を併用しましょう。

日常管理のチェックリスト

- ☐ 毎日の清掃・糞尿の除去
- ☐ 敷料の乾燥とこまめな交換
- ☐ 餌残しの除去
- ☐ 排水溝の清掃・詰まり防止
- ☐ 牛舎周辺の環境整備 (草刈り・堆肥管理など)



気温が高いと、約2週間で成虫になります！

※ハエの発生は気温・湿度・管理状況によって大きく変わります。早めの対策で、牛も人も快適な環境をつくりましょう！